

L'ombre commun (*Thymallus thymallus*)



Crédit photo: Rainer KHÜNIS ©

Description



Taille : jusqu'à 50cm

Généralement de 30 à 40 cm

Poids : jusqu'à 2kg

Généralement de 300g à 1kg

Longévité : 5 ans

Couleur: de gris/vert à gris/bleu

facilement identifiable à sa nageoire

dorsale longue et rouge

Alimentation

L'ombre commun se nourrit principalement de petits invertébrés aquatiques (insectes, mollusques, vers, crustacés) qu'il trouve au fond ou à la dérive. Il lui arrive également de consommer les insectes volants qui tombent dans l'eau. Une fois adulte, les alevins et petits poissons font également partie de son régime alimentaire.

Comportement et habitat

Tout comme la truite fario, il apprécie les cours d'eau froids, purs et bien oxygénés dont le fond est composé de gravier, sable ou galets. Il vit en petits groupes d'une même classe d'âge. Dans le bief, il est présent dans les fosses à l'aval des zones bien oxygénées, posé sur le fond par groupes de 3 à 7 individus. Sa présence indique une eau de bonne qualité et les populations devraient augmenter avec les aménagements réalisés sur le bief.

Il est considéré en danger en Franche-Comté; c'est probablement également le cas en Bourgogne mais aucune donnée n'est disponible sur son état de conservation dans notre région.

Reproduction

La maturité sexuelle arrive autour de 3 ans. Le mâle isole une femelle du groupe et, par de violents mouvements, ils forment une cuvette dans du gravier ou entre 600 et 8000 oeufs sont déposés (en fonction de la taille de la femelle). La reproduction a lieu au printemps dans les zones les plus profondes et bien oxygénées. L'envasement, la présence de barrages, la pollution et le manque d'oxygénation sont les principaux facteurs qui empêchent la reproduction de l'ombre en France et sont responsables de la diminution des populations.